




Espèces principales en Savoie



Espèces d'accompagnement




COR Sp exclusivement lacustre
 OBL Sp à dominante lacustre
 SDF Sp exotique

Rameaux évolutifs de la truite fario

Méditerranéens :


- **A** ⇔ Nombre de points noirs operculaires >8 et généralement <15 ;
- **B** ⇔ Présence obligatoire d'une tache noire pré-operculaire ;
- **C** ⇔ points noirs et/ou rouges de petite taille, de forme irrégulière et très nombreux ;
- **D** ⇔ Marques de parr nombreuses (>10) et étroite formant souvent clairement deux lignes ;
- **E** ⇔ Ligne latérale peu visible ;
- **F** ⇔ absence de frange blanche et noire bordant la nageoire anal.



TRF (250mm ; 185g) – Doron de Pralognan – type méditerranéen




Atlantiques :

- **A** ⇔ Nombre de points noirs operculaires souvent <8 et toujours <15 ;
- **B** ⇔ Tache noire pré-operculaire aléatoire ;
- **C** ⇔ Points noirs et/ou rouges de grosse taille, nettement arrondis et ocellés de blanc ;
- **D** ⇔ Marques de parr plus larges et arrondies et surtout moins nombreuses (<11) ;
- **E** ⇔ Ligne latérale souvent très nette et recoupant des points (le souvent rouges, plus rarement noirs) ocellés de blanc ;
- **F** ⇔ Frange blanche et noire bordant la nageoire anale.



TRF – Cozon
Type atlantique

Critères de différenciation des ombles

Espèce (taille/poids)	Commis- sure des lèvres/yeux	Autres critères	Caudale
Ombles Chevalier <i>Salvelinus alpinus</i> (90cm-8kg)	Mâchoire supérieure dépassant légèrement l'œil	Pas de points noirs 	peu fourchue
Ombles (saumon) de Fontaine <i>Salvelinus fontinalis</i> (50cm-1,5kg)	Mâchoire dépassant largement le bord de l'œil	Lignes/taches ondulées 	droite
<i>Cristivomer salvelinus namaycush</i> (120cm - 40kg)		Bouche largement fendue 	fourchue